

# Csemegekukorica katalógus





| Fajta       | Tenyészdő<br>keléstől<br>(nap) | Cső tulajdonságok |                |                |                         | Szemek alakja        | Üszög<br>érzékenység<br>(1-érzékeny,<br>5-nem<br>érzékeny) | Íz<br>(1-gyenge,<br>5-kiváló) |
|-------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|             |                                | Hossz<br>(cm)     | Átmérő<br>(mm) | Súly<br>(g/db) | Szem<br>sorszám<br>(db) |                      |                                                            |                               |
| Signet      | 70-71                          | 20-20,8           | 49-51          | 380-395        | 16-18                   | apró, gömbölyű, mély | 4                                                          | 5                             |
| Sheba       | 71-72                          | 20,5-21,7         | 47-49          | 350-360        | 14-16                   | gömbölyű, mély       | 5                                                          | 5                             |
| Tasty Sweet | 73-75                          | 20,5-21,3         | 50-51          | 410-420        | 12-14                   | széles, közép mély   | 5                                                          | 4                             |
| Kontrol*    | 70-71                          | 20,5-21,2         | 47-48          | 340-350        | 12-14                   | széles               | 2                                                          | 4                             |

\* Monsanto által 2013/2014-ben 2 magyarországi helyszínen szervezett kísérlet alapján, melyben 4 termék vett részt.


Nincs kompromisszum,  
minőséget az elsők  
között

## Signet F1

Ajánljuk: korai termesztéstechnológiát alkalmazó  
termelőknek

Tenyészdő: 70-71 nap

- Korai, szuperédes hibrid, kitűnő növény habitussal és csőtulajdonságokkal
- Egyöntetű, hengeres, arányos cső
- A csuhé jól védi a szép gömbölyűre berakódott csővéget
- Érés csoportjában egyedülálló apróbb és mélyebb szemeivel
- Vonzó csuhés és fosztott áru, kitűnő íz
- Kiugróan magas cukortartalom



\* Fruktóz, glükóz, szacharóz

\*\* Monsanto által 2013/2014-ben 2 magyarországi helyszínen szervezett kísérlet alapján, melyben 2 termék vett részt.



Ha fontos  
az íz

## Sheba F1

Ajánljuk: korai vetésre

Tenyészdő: 71-72 nap

- A legjobb ízű korai, szuperédes hibrid
- Egy, esetleg két cső növényenként
- Csővége jól berakódik, csuhétakarása jó
- Mély szemek ülnek a viszonylag vékony csutkán
- Könnyen törhető és fosztható



A darabos  
korai

## Tasty Sweet F1

Ajánljuk: kevésbé intenzív technológiára is

Tenyészdő: 73-75 nap

- Korai, szuperédes hibrid
- Nagyobb, súlyosabb csőmérettel követi az érés időben a Sheba-t
- Jól illeszthető a folyamatos termesztéshez
- Rendkívül erőteljes növekedésű növény
- Arányos, piacos cső nagyság
- Intenzív sárga szemszín





| Fajta      | Tenyészdő<br>keléstől<br>(nap) | Cső tulajdonságok |                |                |                      | Növény<br>magasság<br>(cm) | Cső ízesülési<br>magasság<br>(cm) |
|------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|            |                                | Hossz<br>(cm)     | Átmérő<br>(mm) | Súly<br>(g/db) | Szem sorszám<br>(db) |                            |                                   |
| Basin R    | 78-79                          | 23-24,2           | 48-50          | 430-460        | 16-18                | 210- 230                   | 80-90                             |
| Kontrol 1* | 80                             | 21,8              | 53             | 460            | 18-20                | 220-240                    | 120-130                           |
| Kontrol 2* | 83-85                          | 21,5-22,5         | 50-52          | 450-460        | 18-20                | 260-280                    | 130-150                           |

\* Monsanto által 2013/2014-ben 2 magyarországi helyszínen szervezett kísérlet alapján, melyben 3 termék vett részt.

## Basin R

Nagyok között az első

**Ajánljuk:** az éréssor folyamatosságának biztosítására korai hibridjeinket követően

**Tenyészdő:** 78-79 nap

- Középérésű, szuperédes hibrid
- Jó választás, ha fontos a hosszú, darabos csőméret
- Az átlagot meghaladó cső súly a kísérleteinkben
- Egyedülálló mélysárga szín, melyet feldolgozva, főzés után is megtart
- Betegség ellenállóképesség a kukorica rozsdá (*Puccinia sorghi*) 0 rassz ellen (Rp1D gén) **(HR RpD)\***
- Közepes betegség ellenállóképesség a kukorica csíkos mozaik vírus (MDMV), cukornád mozaik vírus (SCMV) és a kukorica baktériumos hervadása ellen (*Erwinia stewartii*) **(IR MDMV/SCMV/Pst)**



\* A különböző Rp gének rezisztenciát nyújtanak a kukoricarozsda néhány, de nem minden egyes rasszával szemben. Egy adott Rp gén vagy Rp gének kombinációjának hatékonysága attól függ, hogy az adott termőterületen mely kukorica rozsdá rasszok találhatók meg.

# Így termeljük mi a SIGNET-et!

Szegedi Lajos, Balmazújváros



» Mit javasolsz azon kertészeknek, akik még kezdőknek számítanak a csemegekukorica termesztésében?

A legfontosabb, hogy megértsék azt, hogy a csemege nem takarmánykukorica, de még nem is konzervgyári, hiszen a csövet értékesítjük, amelynek kívül-belül makulátlannak kell lennie.

» Mégis, hogyan kezdjenek hozzá?

Én azt tudom elmondani, hogy mi hogyan termesztjük, mindenkinek a saját talajára, piacára, technológiájára kell alakítania a termesztést. Mi jól ismerjük talajainkat, de a pontos tápanyagfeltöltéshez szükség van talajvizsgálatra. Ez alapján juttatjuk ki az alpműtrágyát az őszi szántást követően, az őszi bakhátkészítéssel (talajtakaró nélkül) egy menetben, kizárólag a bakhátba, amelyet azért végzünk ősszel, mert egyes években a kora tavaszi munkával csak rögös vetőágyat tudnánk készíteni, és mivel sok a helyrevertett kukoricánk, a jó kelés érdekében lényeges a morzsás talajszerkezet. Műtrágyából ősszel kizárólag káliumot (200 kg K<sub>2</sub>O/ha) és foszfort (100 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/ha) juttatunk ki.

» Vége a télnek, tavaszodik, milyen feladatok vannak még vetésig?

Az ősszel kijuttatott tápanyagon túl tavasszal további 350 kg klórmentes műtrágyát juttatunk ki (műtrágyában kifejezve), amelynek egyharmada ammónium-nitrát,

kétharmada 14-10-20-as komplex műtrágya. Mivel a munkaerő drága, különös figyelmet kell fordítani a gyomirtásra, amelyet preemergensen, a talajtakaró fólia kihúzása előtt végzünk, hogy a fólia alatt is érvényesüljön a gyomirtóhatás. Ezt követi a bakhát víztiszta, perforált fóliával történő takarása március derekán. A víztiszta fóliát azért preferáljuk, mert a feketével ellentétben jól melegszik alatta a talaj. Csepegtetőt nem használunk, kezdetben konzollal, később vízágyúval öntözzünk, ezért kell a perforált talajtakaró.

» Hogyan történik nálatok a vetés, palántálás; mennyire fontos a szakaszolás?

Mi elsősorban export piacra termeljük a tengerit, ezért a jó szakaszolás legalább annyira fontos számomra, mint a koraiság, persze a biztonság figyelembe vételével. Jelentős mennyiségben palántázok, amelyhez a magot március végén vetjük el, 3x3-as térállású tálcákba. A palántanevelés kulcskérdése a korai kukorica termelésének, túl öreg palántát már fölösleges kiültetni, az ideális a 4-5 leveles állapot, amit a kelés után hozzávetőleg 20 napra ér el a növény. Ezt véleményem szerint kis légtérű fóliában nehéz megvalósítani. A palántázást április 20-23-a körül ejtjük meg, részben fátyolos takarás mellett. A palántákat beiszapoljuk és ezzel egy menetben starter műtrágyát juttatunk ki. A bakhátba történő helyrevertést március végén, április elején végezzük 3-4 cm mélyen, amikor a vetőágy hőmérséklete eléri a 12 Celsius fokot. A vetett állományokat szükség szerint kelesztő öntözésben részesítjük.





» Szóljunk pár szót a kukorica tenyésztőterületéről és a gépekről is!



A bakhátat 120 cm széles fóliával készítjük, rajta két sor van, melyek távolsága 50-52 cm, a tőtávolság pedig 22 cm, az ágyásközepek távolsága egymástól 150 cm. A művelő utak között 14 db bakhát van, alkalmazkodva a gépesítettségünkhöz.



Az eszközök jó részét magunk tervezzük, így a bakhátba történő palántálást és helyrevetést is saját készítésű gépekkel végezzük.

» Milyen további kezeléseket alkalmazol a tenyésztő során?

Amikor a napi átlaghőmérséklet eléri a 16-18°C-ot, levesszük a fátlyolfóliát a növényről. Két alkalommal, összesen 100 kg nitrogen hatóanyagot juttatunk ki az állományra fejtrágyaként 5-6 leveles állapotban, majd címerhánnyás előtt megismételjük a kezelést. Mivel a vízigény különösen megnő a címerhánnyás után, így az öntözésre különösen oda kell figyelnünk, de nem csak a vízigény lényeges, hanem a páratartalom is. Ha virágzáskor alacsony a páratartalom, akkor a kötés lesz rossz, ha az ezt követő időszakban alacsony a pára, akkor a szemek szorulhatnak be.

» Sokak számára a kártevők elleni védekezés jelenti a termés szűk keresztmetszetét. Hogy vagytok ti ezzel?

Általában nem jelent különösebb gondot a növényvédelem. A kukoricabogár kevésbé van jelen, az imágó ellen védekezünk, még mielőtt lerakná a tojásait. A levéltetű ellen a berepülés idején permetezünk, de sárga csapdákkal őket is figyeljük, és mivel főleg a címerben telepszik meg, így könnyű észlelni és védekezni ellene. Gyorsan felszaporodhat és komoly



gondot okozhat. A bagolylepke és a moly elleni védekezést a különböző fény- illetve feromoncsapdák előrejelzésére alapozzuk, a legfontosabb hogy a berágás előtt elérjük valamilyen formában a kártevőt.



» Végül elérkeztünk a betakarításhoz, hogyan történik ez nálatok?

Skandináv exportra kerül a kukoricánk, ezért minden évben a tőlünk telhető legjobb minőséget igyekszünk elkészíteni. A szakaszolással érjük el, hogy több héten keresztül mindig friss kukoricát adhassunk, egy szakasszal 3-4 napnál tovább nem számolunk. A törést hajnalban kezdjük, szedőszalaggal konténerbe gyűjtjük és csomagolásig ebben tároljuk 2-4 Celsius fokon. A kukoricát a vevő igényeinek megfelelően előkészítjük, szállításig hűtjük, majd hűtött kamionba rakjuk.



» Aki ismer titeket, az tudja, hogy a területed zömét a SIGNET-tel feded le. Miért tartod jobbnak, mint az egyéb korai fajtákat?

Még kóddal rendelkezett a SIGNET, de már termeltem. Hogy miért? Mert számos előnye van mind a kertész, mind a vevő számára. Vevőimnek a dekoratív, végig bekötött, hengeres, 16-18 szemsorszámú, jó szem-csutka arányú csöve tetszik és nem utolsó sorban az édes íze. Nekem pedig az fontos, hogy a vevőim elégedettek legyenek, valamint hogy a fajta ne legyen érzékeny az üszögre, a cső vége is legyen bekötve és hosszan tövön és pulton tartható legyen.



# Jutalom a szezon végén:

## Sörben pácolt Seminis kukorica grillezve

Paksi András, értékesítési menedzser ajánlásával

### HOZZÁVALÓK:

- 4-6 cső Seminis kukorica
- 2-3 üveg sör (lehetőleg barna)
- vaj
- fűszerek ízlés szerint  
(só, fokhagyma, apróra vágott piros erős paprika, stb.)

### ELKÉSZÍTÉS:

A csuhétól megfosztott kukoricacsöveket áztassuk be barna sörbe, ügyelve arra, hogy a sör elfedje őket. Lehetőleg 6-8 órán keresztül pácoljuk így a kukoricát, majd lecsurgatva helyezzük forró grillre. Szükség szerint forgatva 5-10 perc alatt elkészül a csemege. A vajat összekeverjük az ízlés szerint kiválasztott fűszerekkel és az így elkészült fűszervajjal tálaljuk a frissen grillezett kukoricát.

(A receptnek létezik egy sör- és időkímélő verziója is. A Seminis kukoricacsöveket alufóliára helyezzük, meglocsoljuk barna sörrel, majd becsomagoljuk az alufóliába. Az így becsomagolt csöveket 10-15 percre a grillrácsra helyezve sörben párolt kukoricát kapunk. Itt se feledkezzünk meg a csövek forgatásáról!)



Bővebb információért keresse  
képviselőinket és partnereinket:

**Papp Zoltán** • Telefon: +36 20 973 9625 • E-mail: zoltan.papp@monsanto.com

**Tőzsér Csaba** • Telefon: +36 20 539 2629 • E-mail: csaba.tozser@monsanto.com

**Horváth-Zsíkó Sándor** • Telefon: +36 30 297 7736 • E-mail: sandor.horvath-zsiko@monsanto.com



**Monsanto Hungária Kft.**

1238 Budapest

Túri István út 1.

Telefon: +36 1 289 3100

Fax: +36 1 289 3131

**Vevőszolgálat:**

vevoszolgalat@monsanto.com

Tel: +36 1 289 3122

Fax: +36 1 289 3145

[www.seminis.hu](http://www.seminis.hu)

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK: A Monsanto, vagy munkavállalói, vagy megbízottai által, akár szóban, akár írásban a fajtákról és teljesítményükről átadott információk jóhiszeműen átadott információk, azonban nem tekintendők a Monsanto által az értékesített fajták teljesítményére és alkalmasságára vonatkozó általános érvényű nyilatkozatnak. Egy növényfajta teljesítménye függ a termesztési körülményektől, a helyi időjárási viszonyoktól és egyéb környezeti körülményektől. Ezen okból a Monsanto semmilyen felelősséget nem vállal a nyújtott információkért.